

Oulun yliopisto  
 Matemaattisten tieteiden laitos  
 Funktioiden estimointi  
 13. harjoitus, viikko 18, 2011

1. Todista luentojen s. 151 harjoitustehtäväksi jätetty seikka: matriisi

$$\Phi^T \Phi + n\lambda \Omega, \quad \lambda > 0$$

on positiivisesti definiitti. (Positiivisen semidefiniittisyyden todistaminen ei riitä tämän tehtävän ratkaisuksi!)

2. Tässä tehtävässä johdamme silottavalle kuutiolliselle splinille ristiinvalidoinnissa hyödyllisen identiteetin

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{m}_{n,-i}(x_i; \lambda)]^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[ \frac{Y_i - \hat{m}_n(x_i; \lambda)}{1 - [H(\lambda)]_{ii}} \right]^2, \quad (*)$$

joka on voimassa, kun solmupisteet ovat eri suuria ja  $n \geq 3$ . Tässä  $H(\lambda)$  on luentojen s. 152 määritelty matriisi, jolla on ominaisuus

$$\begin{bmatrix} \hat{m}_n(x_1; \lambda) \\ \vdots \\ \hat{m}_n(x_n; \lambda) \end{bmatrix} = H(\lambda) \begin{bmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}$$

Menettele seuraavasti

- (a) Huomaa, että  $H(\lambda)$  riippuu  $\lambda$ :sta ja solmupisteistä  $x_i$ , mutta ei arvoista  $Y_i$ .
- (b) Huomaa, että  $\hat{m}_{n,-i}(\cdot; \lambda)$  minimoi lausekkeen

$$\frac{1}{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (Y_j - g(x_j))^2 + \lambda \int [g''(x)]^2 dx$$

kaikkien  $C^2$ -funktioden  $g$  muodostamassa avaruudessa ja kulkee pisteen  $(x_i, \hat{m}_{n,-i}(x_i; \lambda))$  kautta, ja päättele tästä, että

$$\hat{m}_{n,-i}(x_i; \lambda) = \sum_{j \neq i} [H(\lambda)]_{ij} Y_j + [H(\lambda)]_{ii} \hat{m}_{n,-i}(x_i; \lambda).$$

- (c) Johda edellisestä tuloksesta identiteetti (\*).

3. Esitä funktio

$$m(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{4} \\ 0, & \text{muuten} \end{cases}$$

Haarin kantafunktioiden  $\{\varphi_0\} \cup \{\varphi_{jk} \mid j \geq 0, 0 \leq k \leq 2^j - 1\}$  avulla. (Kantafunktiot on määritelty luentojen s. 154.)

4. Osoita, että Haarin kantafunktiot ovat ortonormaaleja.

5. Olkoon  $(\varphi_k)_{k \in \mathbb{N}}$  avaruuden  $L^2([0, 1])$  ortonormaali kanta, ja tarkastellaan regressiofunktion estimointia ortogonaalisarjakehtielmän avulla homoskedastisessa regressiotilanteessa

$$Y_i = m(X_i) + \sigma \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n$$

jossa parit  $(X_i, \varepsilon_i)$  ovat eri indekseillä riippumattomia ja samoin jakautuneita, jossa  $X_i$  ja  $\varepsilon_i$  ovat riippumattomia,  $X_i$ :n jakauma on välin  $[0, 1]$  tasainen jakauma,  $E\varepsilon_i = 0$ ,  $E\varepsilon_i^2 = 1$  ja  $\sigma > 0$ .

Oletetaan, että  $m \in L^2([0, 1])$ . Tällöin se voidaan kehittää ortogonaalisarjaksi

$$m = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k,$$

ja eräs luonteva kertoimen  $a_k$  estimaattori on

$$\hat{a}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi_k(X_i) Y_i.$$

Osoita, että  $\hat{a}_k$  on harhaton.